

最新情報

新型コロナウイルスワクチン

令和4年12月15日時点の情報です。
 問 新型コロナウイルスワクチンコールセンター
 ☎ 0570(020)707(ナビダイヤル)
 ● 受付時間 9時～19時(土・日曜日、祝日は17時まで)
 ※ 12月29日～1月3日は除く

最新情報はホームページやLINEでお知らせしています



ホームページ



LINE

新型コロナウイルスワクチン接種は、令和5年3月31日で終了予定です

オミクロン株対応ワクチンについて

みなどがあり、従来型ワクチンと同様の症状が見られています。ほとんどが軽度または中等度で回復することが薬事承認審査で確認されています。

● 新型コロナウイルスワクチンに関する最新情報(市ホームページ)


新型コロナウイルスワクチン接種は、現在、3月31日までを予定しています。接種を希望する人は、できるだけ早く接種を受けるようお願いいたします。
 ※ 今後、国の方針により、実施期間が変更となる場合があります。

● 接種対象者
 オミクロン株対応ワクチンは、従来型ワクチンによる1・2回目接種を完了した12歳以上の人で、前回の接種日から3カ月以上経過している人が、接種できます。
 ※ 1人1回の接種です。

● ワクチンの効果
 オミクロン株に対して、従来型ワクチンを上回る重症化予防効果、感染予防効果、発症予防効果が期待されています。また、オミクロン株と従来株の2種類の成分が含まれていることにより、今後の変異株にも有効である可能性が高いことが期待されています。

● 現在の流行はオミクロン株
 一般的に、新型コロナウイルスは流行していく中で少しずつ変異を起こしていき、それを変異株と言います。現在流行している新型コロナウイルス変異株は、オミクロン株です。

国内での新型コロナウイルス変異株の変遷



● 接種後の副反応
 主な副反応は、注射した部位の痛

● 接種後7日間に現れた症状

発現割合	ファイザー社	モデルナ社
50%以上	注射部位の痛み	注射部位の痛み、疲労
10～50%	疲労、筋肉痛、頭痛、悪寒、関節痛	頭痛、筋肉痛、関節痛、リンパ節の腫れ、悪寒、吐き気・おう吐
1～10%	下痢、注射部位の赤み・腫れ、発熱、おう吐	注射部位の赤み・腫れ、発熱

出典：厚生労働省ホームページより

実施日に限りがありますので、ご確認のうえ、お早めに予約をお願いします。



小児接種
(5～11歳)



1・2回目接種



乳幼児接種
(6カ月～4歳)



3～5回目接種