

インフルエンザ予防接種を受けた後の注意
次のようなことにお気をつけください！

1. 予防接種の後、まれに副反応が起こることがあります。接種後、24 時間（特に接種直後 30 分以内）は副反応の出現に注意してください。

☆ 考えられる副反応

接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れる。

全身のじんましん、繰り返す嘔吐（おうと）、顔色の悪さ、低血圧 など

副反応が現れたら、医師（医療機関）の診察を受けてください。その他、分からないときは下記へお問い合わせください。

2. 予防接種当日の入浴は接種後 1 時間を経過すれば差し支えありませんが、注射した部位を強くこすることはやめましょう。
3. 接種当日はいつもどおりの生活をして構いませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
4. 接種後、抵抗力がつくまでに 2 週間程度を要します。

接種後の問い合わせ先

① 接種した医療機関	
② 市役所(平日のみ)	③消防 (休日・夜間当番医の問い合わせ)
筑紫野市 (カミーリヤ) TEL 9 2 0 - 8 6 1 1	◇筑紫野太宰府消防本部 TEL 9 2 4 - 5 0 3 4 (筑紫野市・太宰府市の方)
春日市 (いきいきプラザ) TEL 5 0 1 - 1 1 3 4	◇春日大野城那珂川消防本部 TEL 5 8 4 - 1 1 9 1 (春日市・大野城市・那珂川市の方)
大野城市 (すこやか交流プラザ) TEL 5 0 1 - 2 2 2 2	
太宰府市 (保健センター) TEL 9 2 8 - 2 0 0 0	
那珂川市 (保健センター) TEL 9 5 3 - 2 2 1 1	