インフルエンザ予防接種を受けた後の注意

次のようなことにお気をつけください！

１．予防接種の後、まれに副反応が起こることがあります。接種後、24 時間（特に接種直後 30 分以内）は副反応の出現に注意してください。

☆　考えられる副反応

接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れる。

全身のじんましん、繰り返す嘔吐（おうと）、顔色の悪さ、低血圧　など

副反応が現れたら、医師（医療機関）の診察を受けてください。その他、分からないときは下記へお問い合わせください。

２．予防接種当日の入浴は接種後１時間を経過すれば差し支えありませんが、注射した部位を強くこすることはやめましょう。

３．接種当日はいつもどおりの生活をして構いませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。

４．接種後、抵抗力がつくまでに２週間程度を要します。

【接種後の問い合わせ先】

接種した医療機関	
市役所 **(平日のみ)**	◇ 筑紫野市（カミーリヤ）　℡９２０－８６１１ ◇ 春日市　（いきいきプラザ）　℡５０１－１１３４ ◇ 大野城市（すこやか交流プラザ）　℡５０１－２２２２ ◇ 太宰府市（保健センター）　℡９２８－２０００ ◇ 那珂川市（保健センター）　℡９５３－２２１１
消防 **（休日・夜間当番医の問い合わせ）**	◇筑紫野太宰府消防本部(筑紫野市・太宰府市の方) ℡９２４－５０３４ ◇春日大野城那珂川消防本部(春日・大野城・那珂川市の方) ℡５８４－１１９１